



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 13 du 2 mai 2002 - 1 page

COLZA : Stade G3 à G4 Maladies

Micosphaerella brassicola

Cette maladie qui correspond à une des formes sexuées du phoma est très présente sur feuilles cette année. Les taches ressemblent à des macules de phoma, avec des fuctifications plus fines et beaucoup plus nombreuses. Elle peut faire des dégâts s'il y a passage sur siliques.

En présence de symptômes sur les étages foliaires intermédiaires ou supérieurs une intervention devra être envisagée avec Punch CS à 0,8 l/ha ou Eria à 2 l/ha (homologués sur oïdium).

Oïdium

Il est présent sur certaines parcelles du sud de la région.

Intervenir avec Punch CS à 0,8 l/ha ou Eria à 2 l/ha en présence de symptômes.

POIS : stade bourgeonnement à début floraison Pucerons verts

Les premières captures sont enregistrées à la tour à succion de Biard et les premiers pucerons sont observés en parcelles sur la façade atlantique.

Une intervention sera nécessaire tout début floraison si vous atteignez le seuil de 30 pucerons par plante (note 2 du dossier Avertel page 22). Ce seuil n'est pas atteint à ce jour.

Maladies Anthracnose

Elle est faiblement présente sur feuilles basses. Le premier traitement début floraison devra néanmoins être orienté vers celle-ci.

Un produit à base de **chlorotalonil** suffira dans un premier temps. Voir dépliant oléoprotéagineux.

BLE : stade F1 visible à début épiaison Maladies foliaires

Pour la **septoriose** le risque est en progression suite au récent passage pluvieux (modèle Presept). En parcelles (sur F3 et F2) elle n'est présente qu'en situations non protégées sur variétés sensibles semées précocement : 30 à 80 % des F3 sont atteintes (ainsi que 5 à 15 % des F2 dans quelques parcelles).

Pour la **rouille brune**, les variétés sensibles (Orvantis, Isengrain et parfois Apache) non protégées sont caractérisées par une progression de l'attaque sur F3, voire sur F2. Cette progression est davantage marquée en Charente.

A noter la présence de **rouille jaune** sur la variété **Autan** dans la Vienne.

Les indications du bulletin précédent restent valables :

- intervenir au stade dernière feuille étalée dans les parcelles non protégées ;
- renouveler la protection dans les situations où celle-ci remonte à plus de trois semaines ;
- pour les quelques parcelles concernées par la **rouille jaune**, une intervention immédiate a dû avoir lieu.

Orge d'hiver : stade épiaison

A part la **rouille naine**, les maladies ont peu progressé.

Terminer la seconde intervention dans les situations les plus tardives.



Prochain bulletin :
le 15 mai sauf situation exceptionnelle



COLZA

Maladies à surveiller

3nF
S&T

7210